

# Pastar<sup>TM</sup> D

## Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA    CONCENTRADO SOLUBLE - SL

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

#### INGREDIENTE ACTIVO:

<b>Aminopyralid:</b> .....	<b>40 g/L</b>
4-amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid. Equivalente a 48.69 g/L de sal dimetilamina de aminopyralid.	
<b>2,4-D:</b> .....	<b>320 g/L</b>
2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Equivalente a 385.6 g/L de sal dimetilamina de 2,4-D.	

Registro Nacional ICA No. 1625

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

#### FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Mamonal Km 14 Vía Cartagena  
Cartagena, Bolívar - Colombia  
Tel: (095) 668 8000

#### DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Diagonal 92 # 17 A - 42 Piso 7°.  
Bogotá, Colombia  
Tel: (091) 219 6000

® <sup>TM</sup> Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Pastar™ D

## Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### GENERALIDADES

**Pastar™ D** es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros.

La eficacia de **Pastar™ D** en el control de malezas de hoja ancha incrementa la carga de pasto por potreros (ton/ha), lo cual repercute en mayor ganancia de peso y/o producción de leche y mayor rentabilidad para el ganadero.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.**
POTREROS	<i>Senna obtusifolia</i> Bicho o chilinchil	0.75 - 1.0 L / 200 L (0.375 - 0.5% v/v) <b>1.5 - 2.0 L/ha*</b>	La dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengán de rebrote.  Aplicar cuando las malezas tengan una altura entre 30 - 80 cm.	7 días** para pasto de corte: heno	48 horas para entrada de trabajadores al área tratada
	<i>Mimosa pudica</i> Dormidera	0.5 - 0.75 L / 200 L (0,25 - 0,375 % v/v) <b>1.0 - 1.5 L/ha</b>			
	<i>Melochia parviflora</i> Flor Blanca	0.75 - 1.5 L / 200 L (0.375 - 0.75% v/v) <b>1.5 - 3.0 L/ha*</b>			
	<i>Sida acuta</i> Escoba negra	2 L / 200 L (1% v/v) <b>4.0 L/ha*</b>			
	<i>Peltaea speciosa</i> Algodoncillo	1.25 - 1.5 L / 200 L (0.625 - 0.75% v/v) <b>2.5 - 3.0 L/ha*</b>			
	<i>Parthenium hysterophorus</i> Mariguano macho	0.75 L / 200 L (0.375% v/v) <b>1.5 L/ha*</b>			

\*En un volumen de agua de 400 L/ha

**P.C. Período de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

\*\* Éste periodo de tiempo se puede incrementar de acuerdo con las prácticas de manejo de cada pradera.

**P.R. Período de Reentrada:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas al área o cultivo tratado.

\*\*\* **P.R. Período de Reentrada de animales:** No hay restricciones de pastoreo para animales lecheros no lactantes u otro ganado incluyendo caballos, ovejas, cabras y otros animales en el área de tratamiento.

No transfiera el ganado desde áreas tratadas (o alimentados con heno tratado) hacia áreas donde cultivos de hoja ancha sensibles puedan ser cultivadas sin permitir antes 3 días de pastoreo o el consumo de heno sin tratar. Si el ganado se transfiere en menos de 3 días, la orina y el estiércol pueden contener suficiente producto para causar daño a las plantas de hoja ancha.



# Pastar™ D

## Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA    CONCENTRADO SOLUBLE - SL

### FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

En aplicación terrestre, **Pastar™ D** se debe aplicar mediante aspersión directa a las malezas de hoja ancha en potreros, utilizando aspersora manual de mochila o si hay posibilidad, usando equipo de aspersión acoplado al tractor.

Evite aplicar cuando las lluvias son inminentes para que no se lave (4 hrs antes de esperar lluvias).

Aplique el producto cuando exista humedad en el suelo (no aplicar en épocas de verano).

Para la aplicación por aspersora manual, hay que preparar la mezcla, llenando el tanque de aplicación con agua hasta  $\frac{1}{4}$  de su volumen y comenzando a agitar, luego agregar la dosis recomendada del producto y completar el nivel de agua.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Pastar™ D

## Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA    CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

**- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR  
(POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).**

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.**

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

**“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.**

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

**“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas”.**

**Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.**

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.**

**“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.**

**INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.**

**INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.**

**NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.**

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS**

**01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

**En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que eso puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Pastar™ D** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Pastar™ D** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

**“Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.**

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO  
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER  
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS Y ALEJADO  
DE ANIMALES DOMÉSTICOS.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

**Fecha aprobación ICA: 16/04/2015**

