



Dow AgroSciences

Rally™

EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Myclobutanil:240 g/L
Alfa-butil-alfa-(4-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitrilo, de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS:c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1383

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences Italia srl
Mozzanica Plant
Strada Statale 11 Km 190,2
24050 Mozzanica (BG) - Italia

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A-42 Piso 7º.
Bogotá (091) 2196000

®™ Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Rally™

EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Rally™ EC es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas contra una amplia gama de hongos.

Rally™ EC se absorbe rápidamente en las hojas, protege las hojas nuevas y controla al hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección. Tiene un efecto residual de 14 a 21 días.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	Pudrición de la vaina <i>Sarocladium oryzae</i>	100 mL/ha*	15 días	12 horas
CEBOLLA	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i> L.	200 mL/ha**	3 días	12 horas
FRÍJOL	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	200 mL/ha**	1 día	12 horas

*Dos aplicaciones

**Para un volumen de agua de 400 L de agua

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, adicione la dosis total del **Rally™ EC**, agite bien y agregue agua hasta llenar el tanque. En caso de mezclas con otros fungicidas o insecticidas se deben hacer pruebas previas de compatibilidad.

Para mejorar la cobertura de la aplicación se recomienda el uso de **Kaytar™ ACT SL** al 0.25% v/v u otro coadyuvante no iónico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En arroz aplicar al inicio de primordio floral (45-50 días después de germinado el cultivo). Debido a la dinámica del patógeno, se recomienda repetir la aplicación en pleno embuchamiento (cerca de los 70-75 días después de germinado el cultivo).

En cebolla y frijol use una vez por ciclo de cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No se han registrado daños a los cultivos cuando se usan las dosis recomendadas. Si se van a realizar mezclas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible con productos que contengan cal.





Dow AgroSciences

Rally™

EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Rally™

EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
- CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas”.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador y otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realizar la aplicación según la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar Rally™ EC en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con Rally™ EC las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Los aplicadores del producto formulado, están obligados a respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

Fecha aprobación ICA: 13/06/2014

