

Curathane[®] NT

**FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTES ACTIVOS:

Mancozeb: Complejo del etilenbis ditiocarbamato de manganeso y zinc	640 g/kg
Cymoxanil: 1[(E)-2-cyano-2-methoxyminoacetyl]-3-ethylurea	80 g/kg

INGREDIENTES ADITIVOS:c.s.p. **1 kg**

Registro Nacional ICA No. 2981

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

FORMULADO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Carrera 50 No. 13-209 - Soledad, Atlántico
Tel: (605) 394 6800

DISTRIBUIDO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401
Bogotá, Colombia
Tel: (601) 259 5900



CORTEVA[™]
agriscience

™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Curathane[®] NT

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS
CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARINÓGENO
CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE TERATOGENICO

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de contacto con la piel:** retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- **En caso de contacto con los ojos:** mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.
- **En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- **En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.



Curathane[®] NT

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 - 9191919**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Mantengalo alejado del calor y las chispas.
- Almacenar en un lugar seco.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.
- No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
- Respetar las franjas de seguridad.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 11/04/2022



Curathane[®] NT

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”


CURATHANE[®] NT es un fungicida con acción preventiva y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además, posee actividad translaminar, lo cual mejora su efecto, especialmente en períodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de aplicación es aspersión foliar.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC. días	PR. horas
PAPA	Gota, (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 kg/ha	7	4
TOMATE	Gota, (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 kg/ha	3	
UCHUVA				
LULO				
TOMATE DE ÁRBOL				
AJÍ				
PIMENTÓN				
AJÍ DULCE				
BERENJENA				

PC. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

PR. Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Disuelva completamente la cantidad de **CURATHANE[®] NT** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 ó la mitad. Complete el volumen total del agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.



Curathane[®] NT

**FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)**

NOTA: Cuando se usan repetidamente fungicidas del mismo modo de acción durante varios años para controlar los mismos patógenos en un mismo campo, razas tolerantes de ocurrencia natural pueden sobrevivir propagándose y llegando a ser dominantes en ese campo.

Un patógeno se considera tolerante a un fungicida cuando, en condiciones climáticas normales, sobrevive a una correcta aplicación del producto, usado en la dosis y época de aplicación recomendados.

El desarrollo de razas tolerantes puede ser evitado o retardado, usando mezclas de productos y/o alternando productos de diferente mecanismo de acción y de equivalente poder de control.

COMPATIBILIDAD:

CURATHANE[®] NT es compatible con los productos a base de Mancozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al cymoxanil sufre degradación.

En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso.

FITOTOXICIDAD:

CURATHANE[®] NT ha mostrado seguridad en los cultivos registrados, no mostrando síntomas de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

