

# Fidato<sup>®</sup> WG

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos Dispersables (WG)**

**Composición Garantizada:**

**Ingrediente Activo:**

<b>Sulfoxaflor</b> .....	300 g/kg
[1-(6-trifluoromethylpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido-λ6-sulfanylidencyanamide) de formulación a 20°C	
<b>Spinetoram</b> .....	100 g/kg
Mezcla de Spinosyn J y Spinosyn L	
<b>Ingredientes Aditivos:</b> .....	c.s.p 1 kg

Registro Nacional ICA No. 3045  
Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

**Formulado Por:**

**Corteva Agriscience LLC**  
9330 Zionsville Road, Indianapolis,  
IN 46268-1054 Estados Unidos

**Importado Y Distribuido Por:**

**Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.**  
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401.  
Tel: (601) 2595900. Bogotá, Colombia.

# Fidato® WG

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### Gránulos Dispersables (WG)

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Generalidades:** FIDATO® WG es un nuevo insecticida formulado con base en dos ingredientes activos sulfoxaflor y spinetoram. Sulfoxaflor pertenece a la nueva familia de insecticidas denominada sulfoxaminas y spinetoram es miembro de los spinosines y actúa por ingestión y contacto y tiene efecto translaminar. Los insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis y finalmente mueren poco tiempo después.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC	PR
AGUACATE	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	200-300 g/ha	7 días	4 horas*
	Chinche ( <i>Monalonionvelezangell</i> )	200-250 g/ha	7 días	4 horas*
ROSA	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	200 g/ha	NA	4 horas*

**P.C. Período de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

**P.R. Período de Reentrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área de cultivo tratado. Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.

\*Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida químico de uso agrícola, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que verifique que el follaje está seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la aplicación del producto.


#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**Aguacate Thrips:** Aplicar en el estado fenológico de floración e inicio de fructificación, realizar por lo menos dos aplicaciones de FIDATO® WG, con periodicidad aproximada de 7 a 10 días, dependiendo de la presión de la plaga y la condición climática. La primera aplicación debe ser en estado inicial de presencia de Trips (*Frankliniella occidentalis*). En Thrips utilizar un volumen de mezcla de 400 Litros/ha.

**Aguacate Chinche:** Aplicar en el estado fenológico de presencia de brotes terminales, inflorescencias y frutos pequeños realizar máximo de dos aplicaciones con periodicidad aproximada de 7 a 10 días, dependiendo de la presión de la plaga y la condición climática. En condiciones de alta presión se recomienda el valor alto del rango (250 g/ha) mientras que en condiciones de menor presencia de plaga podrá ser suficiente el valor bajo del rango (200 g/ha). En Chinche utilizar un volumen de mezcla de 300 Litros/ha.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** En caso de realizar mezclas, realice pruebas a pequeña escala antes de usar. A las dosis recomendadas, FIDATO® WG no causa ningún problema de fitotoxicidad en los cultivos ensayados, ni afecta las poblaciones de benéficos presentes durante la aplicación.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Fidato<sup>®</sup> WG

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### Gránulos Dispersables (WG)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y/O LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINOGENO

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. “Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas dependiendo del cultivo”.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **En caso de contacto con la piel:** retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- **En caso de contacto con los ojos:** mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.
- **En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- **En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Si la persona no respira llame al centro de atención de emergencias toxicológicas y proporcione respiración artificial. Use un protector al suministrar respiración boca a boca.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 – 9191919**

#### ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manténgalo alejado del calor y las chispas.
- Almacenar en un lugar seco.



# Fidato<sup>®</sup> WG

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### Gránulos Dispersables (WG)

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Altamente tóxico para abejas, aplicar el producto lejos de enjambres, en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde.
- No aplicar en presencia de abejas o en época de floración del cultivo.
- No aplicar en horas de alta actividad de abejas.
- Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
- Respete franjas de seguridad con respecto a fuentes de agua.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

