

# Triumph<sup>®</sup> SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO:

Penoxsulam: .....240 g/L  
2-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl) benzenesulfonamide,  
de formulación a 20°C

INGREDIENTES ADITIVOS: .....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1078

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

### FORMULADO POR:

**Corteva Agriscience LLC**

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, USA

Tel: +1 833-267-8382

### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.**

Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia.

Tel: (601) 259 5900

<sup>™</sup> <sup>®</sup> Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.

© Corteva.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Triumph<sup>®</sup> SC

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Triumph<sup>®</sup> SC es un herbicida sistémico y selectivo, de acción pre-emergente perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas y se recomienda para el control de *Echinochloa colona* y algunas malezas ciperáceas y hojas anchas en el cultivo de arroz.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	Liendrepuerco <i>Echinochloa colona</i>	300 mL/ha	60 días	0 horas
	Paja Cortadera, Menta <i>Cyperus iria</i>	300 mL/ha	60 días	0 horas
ARROZ	Liendrepuerco <i>Echinochloa colona</i>	125 mL/ha	60 días	0 horas
	Paja Mona <i>Leptochloa mucronata</i>			
	Guarda Rocío <i>Digitaria horizontalis</i>			
	Pategallina <i>Eleusine indica</i>			
	Paja Cortadera <i>Cyperus iria</i>			
	Palo de Agua <i>Ludwigia linifolia</i>			
	Botoncillo <i>Eclipta alba</i>			
Viernes Santo <i>Phyllanthus niruri</i>				
Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i>				

**P.C. Período de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

**P.R. Período de re-entrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área de cultivo tratado. Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.

### FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Una sola aplicación por ciclo, en pre-emergencia en el cultivo del arroz. Triumph<sup>®</sup> SC puede ser aplicado sobre semilla de arroz tapada o destapada e incluso en proceso de germinación sin afectar el cultivo. Al momento de realizar la aplicación el suelo debe estar con buenas condiciones de humedad, a capacidad de campo, pero sin charcos. Triumph<sup>®</sup> SC puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas se debe conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles (soya, algodón, girasol, maní, ajonjolí, algunos frutales y hortalizas). Mezclas con butaclor no se pueden aplicar sobre semilla destapada. Para aplicaciones aéreas se recomienda utilizar un volumen de 20 galones de mezcla por hectárea. En aplicaciones terrestres utilizar volúmenes entre 100 y 200 litros de agua por hectárea.



# Triumph<sup>®</sup> SC

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo del arroz si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda agregar coadyuvante para mejorar la calidad de la aplicación.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Triumph<sup>®</sup> SC

**LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  
DE USO Y APLICACIÓN**

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.**

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación”.**

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre cultivos susceptibles.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III -  
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO**

## **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

**En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

**En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS  
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

**En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 - 9191919.**

## **ALMACENAMIENTO**

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

## **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Evite contaminar con **Triumph<sup>®</sup> SC** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

“Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

**Fecha aprobación ICA: 06/04/2022**

