

PORTAFOLIO SÚPER GANADERÍA™



Soluciones en potreros

HERBICIDAS

Navius®

CombatranXT™

Pastar™ D

TordonXT™

Tronador™ D



Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto. Después de usar el contenido realice el triple lavado así: vierta agua al envase, agite y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Repita dos veces más. No olvide perforar el envase y devuelva a los lugares establecidos por Compo Limpio.
 DuPont de Colombia S.A. / Calle 113 No. 7-21 Piso 14 Edificio Teleport - Torre A / Bogotá - Colombia **Navius®**: Reg. Nacional ICA 1505- Categoría Toxicológica III- Ligeramente peligroso - Cuidado - Franja Azul
 Dow AgroSciences de Colombia S.A. / Calle 113 No. 7-21 Piso 14 Edificio Teleport - Torre A / Bogotá - Colombia **TordonXT™**: Reg. Nacional ICA 1793 - Categoría Toxicológica III- Ligeramente peligroso - Cuidado - Franja Azul / **Tronador™ D**: Reg. Nacional ICA No. 1418 Categoría toxicológica III Ligeramente peligroso - Franja Azul. **CombatranXT™**: Reg. Nacional ICA 2217 - Categoría Toxicológica III- Ligeramente peligroso - Cuidado - Franja Azul **Pastar™ D**: Reg. Nacional ICA 1625 - Categoría Toxicológica III- Ligeramente peligroso - Cuidado - Franja Azul **EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS**. Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 en Bogotá (091) 2886012.

Navius®

HERBICIDA

SuperPráctico:
Lo tiene todo ganado.



Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales, en manchones o cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.

4



Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.

3



Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero antes de aplicarlo. Permitted que la maleza quede expuesta.

2



Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar con el asesor técnico, en la guía de soluciones, con un distribuidor o en la App de Súper Ganadería™ para conocer cuál es la mejor solución para controlar.

1

Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería™



Dar el tiempo necesario para que el pasto se desarrolle y cubra el área que ocupó la maleza. Evitar sobrepastorear los potreros.

8



Aplicar con buen clima, evitar hacerlo si se esperan lluvias próximas o la aplicación. Aplicar en las horas más frescas del día.

7



Asesurarse de aplicar sobre todo la maleza, mojando el punto de goteo, todos las hojas.

6



Preparar correctamente la mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua lo más limpio posible.

5

8 PASOS DEL ÉXITO DE SÚPER GANADERÍA™



PARA MALEZAS:



HERBÁCEAS SEMI-LEÑOSAS LEÑOSAS ARBUSTIVAS



SOMOS SU ALIADO CONFIABLE EN EL CONTROL DE MALEZAS EN POTREROS, MANTENIENDO LA TRADICIÓN Y LA CALIDAD.



Habilita la cámara de tu celular, pásala frente al código QR y se abrirá un chat donde te atenderemos.



Visitenos en www.corecta.co



Visitenos en cortevea.co

™ Marca registrada de DuPont, Dow AgroSciences y Pioneer y marcas afiliadas a su respectivo dueño.



HERBICIDA

Pastar™ D

SuperRápido:
contundente contra la maleza, rentable con tus potreros.

no hay reto al que no se le mida

HERBICIDA

CombatranXT™

SuperPoderoso:
Lo tiene todo ganado.

SuperFulminante:
mas que una amina.

HERBICIDA

Tronador™ D

experiencia controlando la maleza de raíz.

HERBICIDA



TordonXT™

SuperConfiable:
seguridad, mascarilla y botas).


HERBICIDA

Navius®

Navius[®]
SuperPráctico

 Mortifio (<i>Cnidium rubra</i>)	 Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>)	 Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>)	 Algodoncillo (<i>Peltaea speciosa</i>)	 Bicho o chilinchil (<i>Senna obtusifolia</i>)
5 gr en 20 litros de agua	7.5 - 10 gr en 20 litros de agua	5 gr en 20 litros de agua	5 - 7.5 gr en 20 litros de agua	5 gr en 20 litros de agua


CombatranXT[™]
SuperPoderoso

 Bicho (<i>Senna obtusifolia</i>)	 Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>)	 Algodoncillo (<i>Peltaea speciosa</i>)	 Amor Seco o Pega pega (<i>Desmodium tortuosum</i>)	 Flor Blanca (<i>Melochia parviflora</i>)	 Escoba Negra (<i>Sida acuta</i>)	 Escoba Blanca (<i>Sida Rhombifolia</i>)	 Aromo o Pelá (<i>Acacia farnesiana</i>)	 Muñeco (<i>Cordia allcococca</i>)	 Mindaca (<i>Mascagnia concinna</i>)	 Palma Lata (<i>Bactris guineensis</i>)	 Guayabo (<i>Psidium guajava</i>)
50-100 cc en 20 litros de agua	100 cc en 20 litros de agua	100 cc en 20 litros de agua	100 cc en 20 litros de agua	150 cc en 20 litros de agua	150 cc en 20 litros de agua	150 cc en 20 litros de agua	200 cc en 20 litros de agua	200 - 300 cc en 20 litros de agua	300 cc en 20 litros de agua	300 - 400 cc en 20 litros de agua	300 - 400 cc en 20 litros de agua Dosis para Toconeo 300 cc en 20 litros de agua

Pastar[™] D
SuperRápido

 Bicho o chilinchil (<i>Senna obtusifolia</i>)	 Mariguano macho (<i>Parthenium hysterophorus</i>)	 Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>)	 Arruinarricos o Flor Blanca (<i>Melochia parviflora</i>)	 Algodoncillo (<i>Peltaea speciosa</i>)	 Escoba Negra (<i>Sida acuta</i>)
75 - 100 cc en 20 litros de agua	75 cc en 20 litros de agua	50 - 75 cc en 20 litros de agua	75 - 150 cc en 20 litros de agua	125 - 150 cc en 20 litros de agua	200 cc en 20 litros de agua

TordonXT[™]
SuperConfiable

 Bicho o chilinchil (<i>Senna obtusifolia</i>)	 Bejuco lanoso (<i>Centrocema pubescens</i>)	 Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>)	 Algodoncillo (<i>Peltaea speciosa</i>)	 Arruinarricos o Flor Blanca (<i>Melochia parviflora</i>)	 Malva (<i>Malachra alceifolia</i>)	 Escoba Blanca (<i>Sida Rhombifolia</i>)
100 cc en 20 litros de agua	100 cc en 20 litros de agua	100 - 150 cc en 20 litros de agua	150 cc en 20 litros de agua	150 - 200 cc en 20 litros de agua	200 cc en 20 litros de agua	150 - 200 cc en 20 litros de agua

Tronador[™] D
SuperFulminante

 Bicho o chilinchil (<i>Senna obtusifolia</i>)	 Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>)
150 - 200 cc en 20 litros de agua	100 - 150 cc en 20 litros de agua

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones: