

“USO AGRÍCOLA”



Dow AgroSciences

Rally™

40 W

FUNGICIDA

myclobutanil

FUNGICIDA / POLVO HUMECTABLE
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Myclobutanil: alfa-butil-alfa- (4-clorofenil) -1H 1,2,4-triazol-1-propano nitrilo
(Equivalente a 400 g i.a./kg)

% EN PESO

40.00

INGREDIENTES INERTES:

Diluyente, portador, dispersante, humectante y bolsa soluble en agua

60.00

TOTAL: 100.00

REGISTRO: **RSCO- FUNG-0351-001-002-040**



Nocivo en caso de ingestión

TITULAR DEL REGISTRO:

Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.

PLANTA: Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302,
Cd. Industrial Xicoténcatl, 90434,
Tetla, Tlaxcala. Tel. 01 (241) 418-9300

OFICINAS (tels): (33) 3678-2400

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.

Bvd. Emilio Sánchez Piedras 302,
Cd. Industrial Xicoténcatl, 90434,
Tetla, Tlaxcala.

Tel. 01 (241) 418-9300

®™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

HECHO EN EUA

PRECAUCIÓN

REV.26/01/2017

“ ESTE DOCUMENTO TIENE FINES ILUSTRATIVOS ÚNICAMENTE. NO ES UNA ETIQUETA REAL.”

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Perjudicial si se ingiere, inhala ó es absorbido por la piel. Evitar el contacto directo con la piel, ojos y boca y no respirar el rocío de la aplicación. Usar equipo protector adecuado, consistente en goggles, guantes de hule resistente a químicos que cubran el antebrazo, sombrero, camisa de manga larga y pantalones largos, cuando mezcle, cargue y aplique este producto. La ropa contaminada deberá lavarse por separado en agua caliente antes de volver a usarla. Bañarse bien con agua y jabón después de manejar este producto y antes de comer o fumar.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01 (800) 009-2800 o 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 (Servicio de Información Toxicológica), mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y el paciente está consciente, dé a beber 1 ó 2 vasos con agua en la que se haya dispersado una cucharada de carbón activado. Manténgase al sujeto en reposo y abrigado. No dé a beber nada a una persona en estado de inconsciencia, ni le provoque el vómito.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico. Este producto pertenece al grupo químico de los Triazoles.

Signos y síntomas de intoxicación. Este producto puede causar irritación en la nariz, garganta y vías respiratorias. Asimismo, puede causar irritación de los ojos y de la piel.

Antídoto y tratamiento. No hay antídoto específico contra la intoxicación con este producto, aplicar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCANO.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA. Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de México S.A. de C.V., ésta reembolsaría en importe pagado por el producto. Por ningún motivo Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL. Rally™ 40 W es un fungicida sistémico, curativo y puede ser también utilizado en un programa de aplicaciones preventivas.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES
Manzano (14)	Roña <i>Venturia inaequalis</i> Cenicilla <i>Podospaera leucotricha</i>	12 - 15 g/ 100 L agua	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%.
Crisantemo (SL)	Roya Blanca <i>Puccinia horiana</i>	20 - 40 g/ 100 L agua	
Vid (14)	Cenicilla <i>Uncinula necator</i> Pudrición amarga <i>Guignardia bidwellii</i>	228 g/ha	
Tomate (jitomate), Tomate de cáscara, Chile (1)	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>		
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía (0)	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>		
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Chayote (0)	Tizón foliar <i>Alternaria cucumerina</i>	228 g/ha	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 14 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas. Volumen de aplicación 400 L/ha
Frambuesa roja, Zarzamora, Arándano azul, Arándano rojo, Fresa (0)	Cenicilla polvorienta <i>Sphaerotheca macularis</i>	228 g/ha	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%. Aplicaciones cada 7 días con un máximo por ciclo de 4 aplicaciones. Volumen de aplicación 1200 L/ha.
Cebolla, Cebollín, Ajo, Poro (3)	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	220-342 g/ha	Realizar tres aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 350 L/ha.

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

() Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Los paquetes de plástico de Rally™ 40 W son solubles en agua. No permita que las bolsas se mojen. No maneje las bolsitas con las manos o guantes húmedos. Siempre que no utilice una bolsa completa, envuélvala en una bolsa de plástico para protegerla. No remueva la bolsa soluble de la envoltura, excepto para agregarla directamente al tanque de aspersión. Agregue el número adecuado de bolsas solubles (cerradas) determinada para la dosis recomendada en el tanque de aspersión manteniendo la agitación. Dependiendo de la temperatura del agua y el grado de agitación, las bolsas solubles deberán disolverse completamente aproximadamente en 5 minutos desde el momento que se pusieron en el agua. Siempre ponga Rally™ 40 W en la solución, antes de mezclarlo con otro plaguicida.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar durante la lluvia o llovizna.

FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendada en ésta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD.

Rally™ 40 W es compatible con los plaguicidas oficialmente autorizados para los cultivos aquí recomendados. No obstante se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que se pretendan mezclar.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.